

## (限定)nsNSCLC ヘムブロスマブ カルボプラチン ヘムテレキセド( Pembro CBDCA PEM) Ver.3.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (15) 分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg/body 10時15分 投与 (30) 分で投与 ○フィルター使用確認！</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15) 分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グランセトロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テガロン2mg) … 3管 (30) 分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘムテレキセド(100、500) … 500mg/m<sup>2</sup> (10) 分で投与 11時30~11時40分まで 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチン … AUC=5 (1) 時間で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15) 分で投与 12時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2018; 378: 2078-92

★検査は免疫チェックホイント阻害剤検査を適用してください！

★初回:7日前にメチオパール2A筋注(9週ごと)、パンピタン1g内服(連日)(中止する場合はday22まで可能な限り投与する)

★4コース実施後は維持療法へ