nsNSCLC カルボプラチン＋ペメトレキセド（CBDCA＋PEM）Ver.6.0

	Day1	Day21
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL（瓶） … 1瓶 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ（カイトリル） … 1筒 ！デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 3管 （30）分で投与 9時45分　投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL（瓶） … 1瓶 （15）分で投与 10時15分　投与 点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ペメトレキセド（100、500） … 500mg/㎡ （10）分で投与 10時30分～10時40分まで 10時30分　投与 点滴 … 1 生理食塩液（テルモ）250mL … 1袋 ■カルボプラチン … AUC=5 （1）時間で投与 10時45分　投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL（瓶） … 1瓶 （15）分で投与 11時45分　投与 点滴 … 1	
検査	■---【検査】 血算＋血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 CRP … 1回 CEA … 1回	

出典：J Clin Oncol 27:3217-3224 ASCO2009

●葉酸：初回投与の7日以上前からパンビタン末を1日1回1gを連日投与。（中止する場合はday22まで可能な限り投与する）

●ビタミンB12：初回投与7日前に、メチコバール注500μgを2管筋注する。
その後、投与期間中及び中止後22日目まで9週ごと（3コースごと）に1回注射する。