

nsNSCLC カルボプラチナ+アリムタ(CBDCA+PEM)Ver.6.0

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ケニセトロン静注1mgシリンジ(カトリル) … 1筒 !デキサート注1.65mg(テ'カドロン2mg) … 3管 (30)分で投与 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ペメトレキセド(100、500) … 500mg/m² (10)分で投与 10時30分～10時40分まで 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチナ … AUC=5 (1)時間で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時45分 投与 点滴 … 1</p>	
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 CRP … 1回 CEA … 1回</p>	

出典: J Clin Oncol 27:3217-3224 ASCO2009

●葉酸: 初回投与の7日以上前からパンビタン末を1日1回1gを連日投与。(中止する場合はday22まで可能な限り投与する)

●ビタミンB12: 初回投与7日前に、メチコバール注500μgを2管筋注する。

その後、投与期間中及び中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回注射する。