

(限定)NSCLC(Squamous) ヘムプロリスマブ カルボプラチナ パクリタキセル(Pembro CBDCA PTX) Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 ! テキサート注6.6mg(テガロン8mg)瓶 … 3瓶 グラニセトロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 9時30分 投与 (30)分で投与 点滴 … 1</p> <p>前投与: レスタン錠10mg … 5錠 9時45分 投与 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (15)分で投与 ○レスタン5錠内服確認</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キトルーダ(200mg固定量) … 200mg/body 10時15分 投与 (30)分で投与 ○フィルター使用確認！</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時45分 投与 (15)分で投与</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■パクリタキセル(30、100) … 200mg/m² (3)時間で投与 ○フィルター使用確認 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチナ … AUC=6 (1.5)時間で投与 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 15時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2018; 379: 2040-51

★検査は免疫チェックホイント阻害剤検査を適用してください！

★4コース実施後は維持療法へ