

NSCLC(Squamous) ヘムブロリスマブ カルボプラチナブロキサン(Pembrolizumab CBDCA nabPTX) Ver.3.0

	Day1	Day8	Day15	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ケラニセロン静注1mgシリジン(カイトリル) … 1筒 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 3管 (30)分で投与 9時15分 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし) 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 9時45分 投与 (15)分で投与 ○抗癌剤ルート②(フィルター有) 点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg/body 10時 投与 (30)分で投与 ○抗癌剤ルート②(フィルター有) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時30分 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート②(フィルター有) 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時45分 投与 (15)分で投与 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし) 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アブロキサン(100) … 100mg/m² (30)分で投与 ○フィルター禁止！ ★★★空のパックに調製★★★ 11時 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○アブロキサンと同速度で開始、フラッシュ後速度調整可 11時30分 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし) 生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■カルボプラチナ … AUC=6 (1)時間で投与 11時45分 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1 ○抗癌剤ルート①(フィルターなし)</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アブロキサン(100) … 100mg/m² (30)分で投与 ○フィルター禁止！ ★★★空のパックに調製★★★ 10時30分 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○アブロキサンと同速度で開始、フラッシュ後速度調整可 11時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○アブロキサンと同速度で開始、フラッシュ後速度調整可 11時 投与 点滴 … 1</p>		
検査		<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 CRP … 1回</p>	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 CRP … 1回</p>	

出典:N Engl J Med 2018; 379: 2040-51

★day1の検査は免疫チェックポイント阻害剤検査を適用してください！

★day8,15の検査は自動入力されます。

★4コース実施後は維持療法へ