

NSCLC ラムシルマブ+ドセタキセル(3wRAM+DTX)Ver.1.3

| | Day1 | Day21 |
|------|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 (30)分で投与 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 10時 投与 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■サイラムザ(100、500) … 10mg/kg (1)時間で投与 ○フィルター使用確認 ○全量250mLに調製! ○初回問題なければ30分投与可 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■ドセタキセル(20、80) … 60mg/m² 11時45分 投与 (1)時間で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 フラッシュ用 12時45分 投与</p> | |

出典:Lung Cancer 99(2016) 186-193

★発熱性好中球減少症に注意が必要

★RAM投与後の1時間観察は解除。Infusion reactionには注意が必要！Ver.1.2