

尿路上皮癌 ケムシタビン+シスプラチン(GC)4週投与Ver.3.0

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 9時 投与 ○ブライミング用</p> <p>YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 9時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 500mL … 1袋 (6)時間で投与 15時 投与 点滴… 1</p> <p>YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 21時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 ラクテック注 500mL … 1袋 (5)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1</p> <p>YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL … 0.5管 (4)時間で投与 8時 投与 点滴 … 1</p> <p>D-マンニトール注射液 20%300mL … 1瓶 (2)時間で投与 9時45分 投与 ○アブリベピタド内服確認！ 点滴 … 1</p> <p>ラクテックD注 500mL … 1袋 (6)時間で投与 9時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 15時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>YDリリタ-T3号輸液 500mL … 1袋 (5.75)時間で投与 21時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 YDリリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ラクテックD注 500mL … 1袋 (6)時間で投与 15時 投与 点滴 … 1</p> <p>YDリリタ-T3号輸液 500mL … 1袋 (5.75)時間で投与 21時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p>			
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>					<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>	