

尿路上皮癌 ゲムシタビン(GEM)単独 Ver.1.4

	Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (?) 分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (?) 分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (?) 分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1	

出典: Jpn J Clin Oncol 2007; 37(3) 201-206