

頭頸部癌 セツキシマブ(C-mab)単剤【継続】 Ver.2.1

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>ホ®ラミン注5mg … 2管 ! テキサト注6.6mg(テ®カ®ロン8mg)瓶 … 1瓶 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 9時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (?)時間で投与 … 1時間 【全量240mlに調製する】4ml/分 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明 10時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬		
検査	<p>■---【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典:N Engl J Med 2008; 359: 1116-27

※ FPIは最大6course。その後、C-mabはPDまで継続