

ABVD Ver.3.0

	Day1	Day15	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>ソラ-T1号 500mL … 1瓶 9時 点滴 … 1</p> <p>パロセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋</p> <p>アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ダカルバジン(100) … 375mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 … 1</p> <p>! テキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 25mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 11時15分 投与 【全量100mLに調製する】 側管注 … 1</p> <p>■ブレオ(15) … 9mg/m²(MAX:15mg) 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 11時45分 投与 側管注 … 1</p> <p>■エクザール(10) … 6mg/m²(MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソラ-T1号 500mL … 1瓶 9時 点滴 … 1</p> <p>パロセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋</p> <p>アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ダカルバジン(100) … 375mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 … 1</p> <p>! テキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 25mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 11時15分 投与 【全量100mLに調製する】 側管注 … 1</p> <p>■ブレオ(15) … 9mg/m²(MAX:15mg) 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 11時45分 投与 側管注 … 1</p> <p>■エクザール(10) … 6mg/m²(MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 3日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 3日</p>	