

(限定)130020血液 A-AVD療法 Ver.2.1

	Day1	Day15	Day28	
抗がん剤	<p>■---【注射】 YDソリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 9時 点滴 … 1</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>■ダカルバジン(100) … 375mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 … 1</p> <p>! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10, 50) … 25mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 【全量100mLに調製する】 11時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>■エクザール(10) … 6mg/m²(MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時45分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アドセトリス(50) … 1.2mg/kg ■溶解用注射用水 (30)分で投与 ★最終濃度が0.4~1.2mg/mLになるように希釈液を考慮! 12時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1</p>	<p>■---【注射】 YDソリタ-T1号輸液 500mL … 1袋 9時 点滴 … 1</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>■ダカルバジン(100) … 375mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時30分 投与 点滴ルートも遮光して投与 側管注 … 1</p> <p>! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10, 50) … 25mg/m² 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 【全量100mLに調製する】 11時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>■エクザール(10) … 6mg/m²(MAX:10mg) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時45分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■アドセトリス(50) … 1.2mg/kg ■溶解用注射用水 (30)分で投与 ★最終濃度が0.4~1.2mg/mLになるように希釈液を考慮! 12時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○フラッシュ用 12時30分 投与 側管注 … 1</p>		
投薬	<p>■---【投薬】 ! テカトン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 3日</p>	<p>■---【投薬】 ! テカトン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 3日</p>		