

CHOP-R Ver.3.1

	Day1	Day2	Day3-5	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管 ハロペロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m²(25-125) 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)時間以上かけて … 1時間 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>■オンコピン(1) … 1.4mg/m²(1-2) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分以上かけて … 15分 12時 投与 点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(100、500) … 750mg/m²(200-1875) 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 (?)時間以上かけて … 3時間 12時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 15時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>■リツキシマブ(100、500) … 375mg/m² 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 生理食塩液 50mL(mL入力用) … 40mL (?)mL/時間 … 25mL 【投与速度はプロトコール参照】 ○前投薬の内服を確認！ 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 リツキシマブ終了後 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管 生理食塩液 100mL … 1瓶 10時 投与 点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 2002; 346: 235-42

○day2-5の継続日数は患者様ごと変更される場合があります。

○ドキシソルピシン、オンコピンは患者様の状況で削除する場合があります。

○リツキシマブ点滴30分前にフルフェン200mg、ホラミン4mg内服。リツキシマブ投与日の寝る前にホラミン4mg内服。

○外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。