

CHOP Ver.2.1

| | Day1 | Day2-5 | Day14 |
|------|---|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管 ハロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m²(25-100) 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)時間以上かけて … 1時間 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>■オンコピン(1) … 1.4mg/m²(1-2) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分以上かけて … 15分 12時 投与 点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(100、500) … 750mg/m²(400-1500) 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 (?)時間以上かけて … 3時間 12時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 15時15分 投与 点滴 … 1</p> | <p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管 生理食塩液 100mL … 1瓶 10時 投与 点滴 … 1</p> | |

出典: N Engl J Med 1993; 328: 1002-06

○day2-5の継続日数は患者様ごと変更される場合があります。

○ドキシソルピシン、オンコピンは患者様の状況で削除する場合があります。

○外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。