

(限定)Pola+R-Bendamustine Ver.2.2

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 ! 水溶性プレドニン20mg … 1管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○前投薬の内服を確認! 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■リツキシマブBS(100、500) … 375mg/m² ■生食(リツキサン換算用) … 10倍希釈 (?)mL/時間 … 25mL 【投与速度はプロトコール参照】 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 リツキサン終了後 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (30)分で投与 ○前投薬の内服を確認! 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 0.7瓶 注射用水 20mL … 1管 ■ポライビー(30、140) … 1.8mg/kg ○初回投与が問題なければ30分まで短縮可。 ○フィルター使用確認 (90)分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 12時15分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ベンダムスチン(100) … 90mg/m² (10)分で投与 12時30分～12時40分まで 12時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ベンダムスチン(100) … 90mg/m² (10)分で投与 10時30分～10時40分まで 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p>		

出典：J Clin Oncol 2020;38:155-165

6サイクルまで

★ST合剤またはアックピールの予防投与を推奨（Bendamustine国内第II相試験）。