

R-Bendamustine Ver.6.2

	Day1	Day2	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 ○前投薬の内服を確認! 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■リツキシマブBS(100、500) … 375mg/m² 生理食塩液(テルモ)500mL … 1袋 生理食塩液 50mL(mL入力用) … 40mL (?)mL/時間 … 25mL 【投与速度はプロトコール参照】 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 14時 投与 ○投与開始時間はリツキシマブ投与終了後でOK 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ベンダムスチン(100) … 90mg/m² (?)分で投与 … 10分 14時30分～14時40分まで 14時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 14時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ベンダムスチン(100) … 90mg/m² (?)分で投与 … 10分 10時30分～10時40分まで 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	

出典: Clin Med Insights Oncol 2011; 5; 145-56

★ST合剤またはアシクロベルの予防投与を推奨(Bendamustine国内第Ⅱ相試験)。