

(限定)CHOP-G【2cycle以降】 Ver.2.1

	Day1	Day2	Day3-5	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】                      パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋                      ! 水溶性プレドニン50mg … 2管                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m<sup>2</sup>(25-125)                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間以上かけて … 1時間                      【全量100mLに調製する】                      11時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■オンコビン(1) … 1.4mg/m<sup>2</sup>(1-2)                      生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分以上かけて … 15分                      12時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(500) … 750mg/m<sup>2</sup>(200-1875)                      生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋                      (? )時間以上かけて … 3時間                      12時15分 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      15時15分 投与                      点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】                      ! 水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■ガザイバ(1000mg固定量) … 1000mg/body                      生理食塩液(テルモ) 250mL … 0.84袋                      スピード:25mL/h                      【投与速度はプロトコール参照】                      11時 投与                      点滴 … 1                      ○フィルター使用確認                      ○全量250mLに調製!                      ○前投薬の内服を確認!</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (15)分で投与                      ガザイバ終了後                      点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】                      ! 水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      10時 投与                      点滴 … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2017;377:1331-44

○外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。