

# Pola+GHP-R【1-6cycle】 Ver.2.1

	Day1	Day2	Day3-5	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管                      ハロノセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋</p> <p>○前投薬の内服を確認！                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与</p> <p>生理食塩液 100mL … 0.7瓶                      注射用水 100mL … 1瓶</p> <p>■ポライビー(30、140) … 1.8mg/kg</p> <p>○初回投与が問題なければ30分まで短縮可。                      ○フィルター使用確認                      (90)分で投与                      11時 投与</p> <p>■ドキシソルビシン(10、50) … 50mg/m<sup>2</sup>(25-125)</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間以上かけて … 1時間                      12時30分 投与                      【全量100mLに調製する】</p> <p>■エンドキサン(100、500) … 750mg/m<sup>2</sup>(200-1875)</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋                      (? )時間以上かけて … 3時間                      13時30分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      16時30分 投与</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与</p> <p>■リツキシマブBS(100、500) … 375mg/m<sup>2</sup></p> <p>■生食(リツキサン換算用) … 10倍希釈                      (? )mL/時間 … 25mL                      【投与速度はプロトコール参照】                      ○前投薬の内服を確認！                      11時 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      リツキシマブ終了後</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      10時 投与</p>	

出典:N Engl J Med 2022;386:351-63

★6サイクルまで。7,8サイクルはリツキシマブ単剤投与。

○day2-5の継続日数は患者様ごと変更される場合があります。

○ドキシソルビシンは患者様の状況で削除する場合があります。

○外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。