

(限定)A-CHP Ver.3.1

	Day1	Day2-5	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注ハッグ0.75mg/50mL … 1袋                      ! 水溶性プレドニン50mg … 2管                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m<sup>2</sup>(25-100)                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間以上かけて … 1時間                      11時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(100、500) … 750mg/m<sup>2</sup>(400-1500)                      生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋                      (? )時間以上かけて … 3時間                      12時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶                      ■アドセトリス(50) … 1.8mg/kg(25.2-180)                      ■溶解用注射用水                      (? )分以上かけて … 30分                      ★最終濃度が0.4~1.2mg/mLになるように希釈液を考慮!                      15時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      15時30分 投与                      点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>! 水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      10時 投与                      1時間で投与                      点滴 … 1</p>	

出典:Lancet 2019; 393: 229-40

○day2-5の継続日数は患者様ごと変更される場合があります。

★最終濃度が0.4~1.2mg/mLになるように希釈液を考慮!

○外来の場合、day2-5のプレドニン100mgは内服で。