

(限定)130030血液 Romidepsin(イストダックス)Ver.1.1

	Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒</p> <p>10時 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■イストダックス(10) … 14mg/m<sup>2</sup></p> <p>10時30分 投与 (4)時間で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 14時30分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒</p> <p>10時 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■イストダックス(10) … 14mg/m<sup>2</sup></p> <p>10時30分 投与 (4)時間で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 14時30分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 グラニセロン静注1mgシリンジ(カイトリル) … 1筒</p> <p>10時 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■イストダックス(10) … 14mg/m<sup>2</sup></p> <p>10時30分 投与 (4)時間で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 14時30分 投与 フラッシュ用 1回</p>	

出典: J Clin Oncol 2012;30:631-636、Int J Hematol 2017;106:655-665

制吐剤の予防投与は強く推奨されたが、DEXは本剤の代謝酵素であるCYP3A4を誘導し、作用が減弱するおそれがあるため、グラニセロンやメクロプラミドの使用をすすめている。