

(限定)KRd (Carfilzomib/LEN/DEX)【13-18cycle】

	Day1	Day2	Day8	Day15	Day16	Day22	Day28	
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 6瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイクロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイクロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p style="text-align: center;">レナデックス40mg 手動入力!</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 6瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイクロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイクロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p style="text-align: center;">レナデックス40mg 手動入力!</p>		
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! レナリドミトカプセル5mg … 5Cap 1日1回 寝る前 OKRd:3週投与1週休業。day1の夜から開始 21日</p>							

出典:NEJM 2015; 372:142-52

★day8、22にレナデックス(DEX)40mgの処方入力必要!

★LENは患者限定申請書をご提出ください。

★LEN、DEXの減量が必要な場合は手動となります。