

(限定)DKd(Daratumumab Carfilzomib DEX)【皮下注1cycle】 Ver.1.1

| | Day1 | Day2 | Day8 | Day9 | Day15 | Day16 | Day22 | Day28 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 ○前投薬の内服を確認！</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…20mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> <p>皮下注…1 ■ダラキューロ(1800mg固定量)…1800mg 11時30分 投与 ○3～5分かけて腹部に皮下注</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…20mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 ○前投薬の内服を確認！</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…56mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> <p>皮下注…1 ■ダラキューロ(1800mg固定量)…1800mg 11時30分 投与 ○3～5分かけて腹部に皮下注</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…56mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> <p>皮下注…1 ■ダラキューロ(1800mg固定量)…1800mg 11時30分 投与 ○3～5分かけて腹部に皮下注</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 ○前投薬の内服を確認！</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…56mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> <p>皮下注…1 ■ダラキューロ(1800mg固定量)…1800mg 11時30分 投与 ○3～5分かけて腹部に皮下注</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 17キート注6.6mg(7カドD)8mg/瓶…3瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴…1 ブドウ糖注 5% 100mL…0.5瓶 ■カイプロリス(10,40)…56mg/m² ■溶解用注射用水 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解</p> <p>点滴…1 生理食塩液 50mL(瓶)…1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 フラッシュ用 (15)分で投与</p> | <p>■---【注射】</p> <p>皮下注…1 ■ダラキューロ(1800mg固定量)…1800mg ○3～5分かけて皮下注</p> | | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>アセトアミノフェン錠【500mg】(カロナール)…2錠 レスタミンコ錠 10mg…5錠 モルホリン100錠10mg(ソクシア)…1錠 1日1回 朝食後 ○ダラキューロ投与1時間前までに内服！ 1日</p> | | <p>■---【投薬】</p> <p>アセトアミノフェン錠【500mg】(カロナール)…2錠 レスタミンコ錠 10mg…5錠 1日1回 朝食後 ○ダラキューロ投与1時間前までに内服！ 1日</p> | <p>■---【投薬】</p> <p>アセトアミノフェン錠【500mg】(カロナール)…2錠 レスタミンコ錠 10mg…5錠 1日1回 朝食後 ★★次回ダラキューロ注射1時間前までに内服★★ 1日</p> | | <p>■---【投薬】</p> <p>！(限定)ルナテックス錠4mg…5錠 アセトアミノフェン錠【500mg】(カロナール)…2錠 レスタミンコ錠 10mg…5錠 1日1回 朝食後 ★★次回ダラキューロの翌日に内服★★ 1日 アセトアミノフェン錠【500mg】(カロナール)…2錠 レスタミンコ錠 10mg…5錠 1日1回 朝食後 ★★次回ダラキューロ注射1時間前までに内服★★ 1日</p> | | | |
| 検査 | <p>■---【検査】</p> <p>血液型(ABO,RhD)…1回 不規則性抗体検査…1 ケムス試験(直接)…1回 ケムス試験(間接)…1回 ○ダラキューロ投与前検査</p> | | | | | | | | |

出典：Lancet 2020;396:186-97 Lancet Haematol 2020;7:e370-80

★day9までは入院設定。day15以降は外来設定。

★ダラキューロ、レナデックスは患者限定薬です。

★DEXの減量が必要な場合は手動となります。(76歳以上はDEX：20mg/週)